
Liolaemus altissimus araucaniensis (Sauria: Tropiduridae: Liolaeminae)
en Antuco, Chile

Recibido 21-III-2002.

Aceptado 22-III-2002.

Donoso-Barros (1974) documenta a la lagartija *Liolaemus bibronii* (Bell, 1843) para Laguna del Laja, Antuco, Octava Región de Chile (37°21' S, 71°19' W). Un examen del material estudiado por este autor permite identificarlo en parte como *L. altissimus araucaniensis* Müller y Hellmich, 1932 (Museo de Zoología, Universidad de Concepción, MZUC números 23658, 23660 y 23661, recolectados en Antuco, Coicon (37°29' S, 71°20' W); Febrero de 1970), hallazgo que permite registrar por primera vez a *L. a. araucaniensis* para la Octava Región de Chile, forma conocida hasta ahora únicamente de Villarrica (37°25' S, 71°57' W), al sur de la Novena Región Administrativa (Velooso y Na-

varro 1988), extendiendo así su rango distribucional considerablemente más al norte. Los ejemplares restantes de la serie estudiada corresponden a *L. bibronii*. Gracias a Herman Núñez y Jorge N. Artigas, por permitir la revisión de especímenes.

REFERENCIAS

- Donoso-Barros, R. 1974. Notas Herpetológicas. Bol. Soc. Biol. Concepción 47: 285-287.
- Velooso, A. & J. Navarro. 1988. Lista sistemática y distribución geográfica de anfibios y reptiles de Chile. Boll. Mus. Reg. Sci. Natur. Torino 6: 481-539.

Daniel Pincheira-Donoso

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile; dpinchei@udec.cl